

古今藥物別名考

草部

黃耆別名

芫草，戟樞，王孫，蠟糝，蜀脂，獨樞，百本，羊脂，白芷，黃芩，綿，末日服二錢法，治吐血不止有以黃者二錢半紫浮萍三錢每服一錢蜜水送下，

人 参	甘 草
別 名	別 名

露草，粉草，國老，蜜草，美草，蜜甘，靈通，能解百藥毒，人御，鬼蓋，血參，神草，海腴，土精，地精，皺面還丹，本草衍義載，人參在明以前，心州，高麗，邯鄲，百濟，澤州，冀州，并州，幽州，嬀州，易州，平州均產參，以上黨山谷出者爲最，蓋古人於上述所產之參，皆爲人參，惟以山西潞安太行野生所產之紫團參（即上黨參）爲地道人參，自明以後，疆界廣闊，則以吉林南，遼寧東之長白山，及吉林寧安縣出產的野山參，爲上品。

吉林參別名

人參，

清水人參，野山參，移山參，石柱參，秧子參，白抄參，太子參，廠參，遼江參，

產於吉林寧古塔，撫松，寬甸，通化，臨江，興京各山陰中，稟性醇正，甘溫微苦，滋養陰津，可稱獨步，至吉林南境，濛江迤東，南嶺北山一帶，參營遍地，皆由人工栽種，功效薄弱，

野山參，係山中自然生成者，葉如秋海棠，三四月發芽，六月開小白花，地白如韭，八月結子，若小豆而連環，色正紅，久之則黃而扁，初生一椀，四五年兩椀，十年三椀，久者四椀，每椀五葉，莖直上，高者數尺，低者尺餘，花開獨一枝，單生一莖，不與俗草爲伍，他花隨風飄動，獨參花風不能搖而反靜，誠神草也，頸有螺絲紋，身尾有珍珠丁，蘆細長，故入山採參者類多識之，老山參年代在二百年以上，最少亦數十年者，能補欲絕之

元氣，

野山參生於濕潤之處，故稟性屬陰，見日即爛，不若其他植物，多生於山陽，喜受日光之溫煦，產參之區域，山勢多險峻，周圍千餘里，崇山大川，森林茅草，遮掩其間；晨起視之，瘴霧迷漫，終年不見日光，寒風徹骨，甚有終年冰雪，不能融化之處，今之所用者多河北樵場，博易，安東，石柱溝所出，狀率虛軟，味薄不苦，非真品也，

移山參，乃就野山生成之參，約三五十年不等，採參者明知年限尚少，又恐被人採去，故掘起再行移植家圃中，氣力品價次之，

扒山參，爲山野所生，苗將出未出之際，被人或禽獸踐踏，參苗陷入土中，再數十年復苗，爲採參所得，功效與野山參略同，太子參，卽遼參之小者，功效劣於移山參，生於吉林太子河故

名，

石柱參，產於遼寧安東之石柱溝，或新開河，與朝鮮開城相隔一河，園種頗多，其功用較野山減百分之八十，性甘溫，俗名石柱參，亦名滿州紅參，

秧子參，乃各縣參圃所栽種者，亦名養參，大半出於人工，有赤白兩種，其性味帶燥，惟補氣尚可，鳳凰城及濛江一帶所產製者最多，

白抄參，與秧子參相似，

廠參，邊江參，乃以地而名，其地週二百里內外所產，較鳳凰城堅實，且紅潤可觀，味苦微甘，皆非地道之品，功效略勝秧子參，紅參，乃蒸製兩次者，白參，乃未經蒸製者，

統貨，參之上等者，拗色，參之中等者，泡丁，參之下等者，

白條參，朝鮮參，韓國參，百濟參，新羅參，紅參，白參，別

高麗參別名